

REF 1157

REF 1159



EC REP

MT Promedt Consulting GmbH
Ernst-Heckel-Straße 7
66386 St. Ingbert Germany

1157-1159-IFU-Aug22-v3.0



optimummedical®



EU Importer:
Optimum Medical Solutions GmbH,
c/o Grant Thornton AG,
Senckenbergenanlage 19,
60325 Frankfurt am Main, Germany.
Email: enquiries@optimummedical.de



Optimum Medical Solutions Ltd
Tennant Hall, Blenheim Grove,
Leeds, LS2 9ET, United Kingdom
T: +44(0) 845 643 5479
enquiries@optimummedical.co.uk
www.optimummedical.co.uk

vue.TM
ultrasound gel

TM



Instructions for use

GBR INSTRUCTIONS FOR USE

This is a product information leaflet for the user.

Read all of the product information leaflet prior to use and retain for your information.

If you are unsure about how to use this product, or whether it is suitable for you, please seek medical advice.

PRODUCT DESCRIPTION:

Vue Ultrasound Gel is a non-sterile, water-based gel.

INGREDIENTS/COMPOSITION

- Deionised water
- Carbomer
- Propylene glycol
- Triethanolamine
- Benzyl alcohol
- Methylchloroisothiazolinone
- Methylisothiazolinone

INTENDED PURPOSE:

Vue Ultrasound Gel is a medical device intended to be used for the transmission of ultrasonic waves during low-risk examinations in areas involving intact skin; in examinations that do not involve invasive procedures; or more than 24 hours prior to a probable invasive procedure at or near the same site.

INDICATIONS FOR USE / INTENDED USER:

Vue Ultrasound Gel is a medical device intended to be used by Healthcare Professionals when performing ultrasound.

CONTRAINDICATIONS:

- Do not use for invasive procedures, that is any ultrasound-guided procedure that involves passing a device through skin into sterile tissue, such as intravenous line insertion or fine needle aspirate;
- Do not use if an invasive procedure is likely to be undertaken in the following 24 hours – this includes' viewing or initial assessment' of a site by ultrasound prior to undertaking an (aseptic) invasive procedure;
- Do not use in labour where there is high likelihood of C-section or invasive instrumentation during delivery;
- Do not use where there is contact with or near to non-intact skin (any alteration in skin integrity such as a rash or surgical wound, including umbilicus in neonates);
- Do not use where the ultrasound examination is near to an indwelling invasive device, such as an intravenous line or suprapubic catheter;
- Do not use where there is contact with a mucous membrane (for example for transrectal, transvaginal or ophthalmic procedures);
- Do not use for examinations on severely immunocompromised individuals, in an intensive-care setting, high-dependency, or equivalent unit/s, including neonatal intensive care units;
- Do not use if the patient is sensitive or allergic to any of the ingredients;
- Not suitable for use with a defibrillator, ECG or laser treatment.

WARNINGS AND PRECAUTIONS:

- It is recommended that Vue Ultrasound Gel is used in line with local healthcare policies and procedures.
- Ensure that Vue Ultrasound Gel is suitable for the intended use and compatible with other medical devices to be used in conjunction with it.
- Do not use if the bottle is out of date, damaged, soiled or the seal is broken prior to first use.
- Do not refill. Reuse or refilling of the bottle may result in infection and/or cross-contamination.
- Do not decant into smaller bottles as there is a risk of contamination.
- Clean the whole bottle, including the tip, with a disinfectant wipe between uses.
- The tip/nozzle of bottle should not come into contact with anything – if it does, clean immediately with a disinfectant wipe.
- If an invasive procedure is subsequently undertaken within 24 hours of the use of non-sterile gel at or near

to the site, then ensure all residual gel is removed, and the skin is thoroughly cleaned using antiseptic skin preparation in line with local policy for the procedure.

- For external use only.
- Not to be ingested.
- Avoid contact with the eyes.
- Keep out of reach of children.
- Vue Ultrasound Gel is not made with natural rubber latex.

UNDESIRABLE SIDE EFFECTS:

There are no known side effects associated with using **Vue Ultrasound Gel**, however, in rare cases local irritation or hypersensitivity may occur. Symptoms of irritation or hypersensitivity include redness, itchiness, or blistering. If this occurs, stop using **Vue Ultrasound Gel** and ensure patient records are updated.

Any serious incident or malfunction that has occurred in relation to the **Vue Ultrasound Gel** should be reported to the manufacturer and the Competent Authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

HOW TO USE:

Prior to use, label the bottle with the date first opened on the space provided. Once opened, dispose of the bottle when either empty, after one month or on expiry date, whichever comes first (see warnings and precautions). Close cap between uses.

Always wash and dry your hands before and after using **Vue Ultrasound Gel** and apply a clean pair of gloves on every occasion to avoid cross infection.

1. Clean the patient's skin prior to applying **Vue Ultrasound Gel**.
2. Follow the instructions supplied by the manufacturer of the equipment being used to perform the medical ultrasound procedure.
3. Apply the required amount of **Vue Ultrasound Gel** to the area of skin/equipment.
4. Following the procedure, remove any remaining ultrasound gel from the patient's skin using personal hygiene wipes or wash off using patient dry wipes and soap and water.
5. Dry the patient's skin thoroughly afterwards with paper towels.

STORAGE AND HANDLING:

Store between 5°C and 30°C. Keep dry and out of direct sunlight. Unopened packs have a 3-year shelf life. Do not use after expiry date.

DISPOSAL:

Vue Ultrasound Gel must be disposed of according to local policies and waste disposal procedures, including any accessories / consumables used with the device.

MANUFACTURER INFORMATION:

Optimum Medical Solutions Ltd, Tennant Hall, Blenheim Grove, Leeds, LS2 9ET, UK. Tel: +44 (0) 845 643 5479, Email: enquiries@optimummedical.co.uk, Website: www.optimummedical.co.uk

AUTHORISED REPRESENTATIVE:

MT Promedt Consulting GmbH, Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Germany. Tel: +49 (0) 689 458 1020, Email: info@mt-promcons.com

EU IMPORTER INFORMATION:

Optimum Medical Solutions GmbH, c/o Grant Thornton AG, Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt am Main, Germany. Email: enquiries@optimummedical.de

FRA

MODE D'EMPLOI

Ceci est une notice d'informations concernant le produit, destinée à l'utilisateur.

Lire l'intégralité de la notice du produit avant utilisation et la conserver à titre d'information.

En cas de doute concernant ce produit ou son caractère approprié, consulter un professionnel de santé.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Vue Ultrasound Gel est un gel non stérile à base d'eau.

COMPOSITION

- Eau déionisée
- Carbomère
- Propylène glycol
- Triéthanolamine
- Alcool benzyllique
- Méthylchloroisothiazolinone
- Méthylisothiazolinone

USAGE PRÉVU

Vue Ultrasound Gel est un dispositif médical prévu pour être utilisé afin de transmettre des ondes à ultrasons lors d'exams à faibles risques dans des zones impliquant de la peau intact, lors d'examens n'impliquant pas d'interventions invasives, ni plus de 24 heures avant une intervention invasive probable sur le même site ou à proximité de celui-ci.

INDICATIONS D'UTILISATION / UTILISATEUR PRÉVU

Vue Ultrasound Gel est un dispositif médical prévu pour être utilisé par des Professionnels de santé lors d'une intervention à ultrasons.

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser lors d'interventions invasives, à savoir toute intervention guidée par ultrasons et impliquant le passage intra-cutané d'un dispositif dans un tissu stérile, comme l'insertion d'une ligne intraveineuse ou un aspirat à aiguille fine ;
- Ne pas utiliser s'il est probable qu'une intervention invasive ait lieu dans les 24 heures suivantes : ceci inclut la visualisation ou évaluation d'un site » par ultrasons avant d'entamer une intervention invasive (aseptique) ;
- Ne pas utiliser lors du travail s'il existe une forte probabilité de césarienne ou d'utilisation d'instruments invasif au cours de l'accouchement ;
- Ne pas utiliser en cas de contact à la proximité d'une peau qui n'est pas intacte (toute altération de l'intégrité de la peau, telle qu'une éruption ou lésion chirurgicale, notamment le nombril chez les nouveau-nés) ;
- Ne pas utiliser lorsque l'examen par ultrasons a lieu près d'un dispositif invasif installé, comme une ligne intraveineuse ou un cathéter suspien ;
- Ne pas utiliser en cas de contact avec une membrane muqueuse (par exemple lors d'interventions transrectales, transvaginales ou ophthalmiques) ;
- Ne pas utiliser pour des examens chez des personnes fortement immunodéprimées, sous soins intensifs, fortement dépendantes, ni dans une / des unité(s) équivalente(s), telles que des unités de soins intensifs pour nouveau-nés;
- Ne pas utiliser si le patient est sensible ou allergique à l'un des ingrédients;
- Non adapté à une utilisation avec un défibrillateur, ECG ou traitement laser.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

- Il est recommandé d'utiliser Vue Ultrasound Gel conformément aux procédures et politiques de santé locales.
- S'assurer que Vue Ultrasound Gel est adapté à l'utilisation prévue et compatible avec les autres dispositifs médicaux à utiliser conjointement.
- Ne pas utiliser si le flacon est périmé, endommagé, souillé ou si le joint de garantie d'étanchéité est brisé avant la première utilisation.
- Ne pas re-remplir. La réutilisation ou le re-remplissage du flacon risque d'entraîner une infection et / ou

une contamination croisée.

- Ne pas faire décanter dans de plus petits flacons, car il existe un risque de contamination.
- Nettoyer le flacon dans son intégralité, extrémité incluse, avec une lingette désinfectante entre deux utilisations.
- L'extrémité / L'embout du flacon ne doit entrer en contact avec rien – si cela se produit, le nettoyer immédiatement avec une lingette désinfectante.
- Si une intervention invasive a lieu dans les 24 heures suivant l'utilisation du gel non stérile ou à proximité du site, s'assurer que tout résidu de gel soit retiré et que la peau soit soigneusement nettoyée à l'aide d'une préparation antiseptique pour la peau, conformément à la politique locale adaptée à l'intervention.
- Destiné exclusivement à un usage externe.
- Ne pas ingérer.
- Éviter tout contact avec les yeux.
- Conserver hors de portée des enfants
- **Vue Ultrasound Gel** n'est pas constitué de latex de caoutchouc naturel.

EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS

Il n'existe aucun effet indésirable connu associé à l'utilisation de **Vue Ultrasound Gel** ; toutefois, dans certains cas rares, une hypersensibilité ou irritation locale peut survenir. Les symptômes d'irritation ou d'hypersensibilité comprennent des rougeurs, des démangeaisons ou des cloques. Si cela se produit, cesser d'utiliser **Vue Ultrasound Gel** et s'assurer que les dossiers du patient sont à jour.

Tout incident grave ou dysfonctionnement qui s'est produit en lien avec **Vue Ultrasound Gel** doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et / ou le patient sont établis.

MODE D'UTILISATION

Avant utilisation, étiqueter le flacon en indiquant la date de première ouverture à l'endroit prévu à cet effet. Une fois ouvert, éliminer le flacon lorsqu'il est vide, après un mois ou à la date d'expiration, selon l'échéance qui survient en premier (voir les mises en garde et précautions). Refermer le capuchon entre deux utilisations. Toujours se laver et se sécher les mains avant et après l'utilisation de **Vue Ultrasound Gel**, et enfiler une paire de gants à chaque fois pour éviter les infections croisées.

1. Nettoyer la peau du patient avant d'appliquer **Vue Ultrasound Gel**.
2. Suivre les instructions fournies par le fabricant de l'équipement utilisé pour effectuer la procédure d'échographie médicale.
3. Appliquer la quantité requise de **Vue Ultrasound Gel** sur la zone de la peau de l'équipement.
4. Après la procédure, retirer le gel restant sur la peau du patient à l'aide de lingettes d'hygiène personnelle ou nettoyer à l'aide de lingettes sèches pour patients et d'eau et de savon.
5. Sécher ensuite soigneusement la peau du patient avec des serviettes en papier.

STOCKAGE ET MANIPULATION

À conserver entre 5 °C et 30 °C. À conserver au sec et à l'abri de la lumière directe du soleil. Les emballages non ouverts ont une durée de conservation de 3 ans. Ne pas utiliser au-delà de la date d'expiration.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Vue Ultrasound Gel doit être éliminé conformément aux procédures de gestion des déchets et politiques locales, ceci incluant tout accessoire / consommable utilisé avec le dispositif.

INFORMATIONS SUR LE FABRICANT

Optimum Medical Solutions Ltd, Tennant Hall, Blenheim Grove, Leeds, LS2 9ET, RU. N° tél. : +44 (0) 845 643 5479 . Courriel : enquiries@optimummedical.co.uk Site Internet : www.optimummedical.co.uk

REPRÉSENTANT AUTORISÉ

MT Promedt Consulting GmbH, Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Allemagne. N° tél. : +49 (0) 689 435 479. Courriel : info@mt-procons.com

INFORMATIONS SUR L'IMPORTATEUR

Optimum Medical Solutions GmbH, c/o Grant Thornton AG, Senckenbergenanlage 19, 60325 Francfort-sur-le-Main, Allemagne. E-mail : enquiries@optimummedical.de

DEU GEBRAUCHS-INFORMATIONEN

Informationsblatt für den Benutzer

Lesen Sie vor dem Gebrauch das gesamte Informationsblatt und bewahren Sie es zu Ihrer eigenen Sicherheit auf. Wenn Sie unsicher sind, wie Sie dieses Produkt verwenden sollen oder ob es geeignet ist, nehmen Sie bitte ärztlichen Rat in Anspruch.

PRODUKT BESCHREIBUNG

Vue Ultraschall Gel ist ein nicht steriles Gel auf Wasserbasis.

INHALTSSTOFF/ZUSAMMENSETZUNG

- Entionisiertes Wasser
- Carbomer
- Propylenglykol
- Triethanolamin
- Benzylalkohol
- Methylchlorisothiazolinon
- Methylisothiazolinon

VERWENDUNGSZWECK

Vue Ultraschall Gel ist ein medizinisches Produkt, das zur Übertragung von Ultraschall Wellen im Rahmen von Untersuchungen mit geringem Risiko in Bereichen mit intakter Haut, bei Untersuchungen ohne invasive Eingriffe oder mehr als 24 Stunden vor einem wahrscheinlichen invasiven Eingriff an derselben Stelle oder in der Nähe derselben Stelle verwendet werden soll.

ANWENDUNGSHINWEISE / VERWENDUNGSZWECK

Vue Ultraschall Gel ist ein medizinisches Produkt, das für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal bei der Durchführung von Ultraschall Untersuchungen bestimmt ist.

GEGENANZEHEN:

- Nicht bei invasiven Eingriffen anwenden, d. h. bei jedem ultraschallgesteuerten Verfahren, bei dem ein Gerät durch die Haut in steriles Gewebe eingeführt wird, wie z. B. beim Legen eines intravenösen Zugangs oder einer Feinnadelaspiration;
- Nicht anwenden, wenn in den folgenden 24 Stunden ein invasiver Eingriff geplant ist - dies schließt die Besichtigung oder Erstebeurteilung* einer Stelle mittels Ultraschall vor einem (aseptischen) invasiven Eingriff ein;
- Nicht während der Wehen anwenden, wenn die Wahrscheinlichkeit eines Kaiserschnitts oder invasiver Eingriffe während der Geburt hoch ist;
- Nicht bei Kontakt mit oder in der Nähe von nicht intakter Haut (jede Veränderung der Hautintegrität wie z. B. ein Ausschlag oder eine Operationswunde, einschließlich Nabel bei Neugeborenen) anwenden;
- Nicht anwenden, wenn sich die Ultraschall Untersuchung in der Nähe einer invasiven Verweilvorrichtung befindet, wie z. B. einer intravenenösen Leitung oder eines suprapubischen Katheters;
- Nicht bei Kontakt mit einer Schleimhaut anwenden (z. B. bei transkutalen, transvaginalen oder ophthalmischen Eingriffen);
- Nicht für Untersuchungen an schwer immungeschwächten Personen, auf Intensivstationen oder vergleichbaren Einrichtungen, einschließlich neonataler Intensivstationen, anwenden;
- Nicht anwenden, wenn der Patient empfindlich oder allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe ist;
- Nicht geeignet für die Anwendung mit einem Defibrillator, EKG oder einer Laserbehandlung.

WARNHINWEIS UND VORSICHTSMASSENNAHMEN

- Es wird empfohlen, **Vue Ultraschall Gel** in Übereinstimmung mit den örtlichen Richtlinien und Verfahren des Gesundheitswesens anzuwenden.
- Vergewissern Sie sich, dass **Vue Ultraschall Gel** für den vorgesehenen Verwendungszweck und für die medizinischen Geräte, die in Verbindung mit ihm verwendet werden sollen, geeignet ist.
- Nicht verwenden, wenn das Haltbarkeitsdatum abgelaufen, die Flasche beschädigt oder verschmutzt ist oder wenn das Siegel vor dem ersten Gebrauch beschädigt wurde.
- Flasche nicht wiederbefüllen. Die Wiederverwendung oder Wiederbefüllung der Flasche kann zu Infektionen und Kreuzkontaminationen führen.
- Nicht in kleinere Flaschen umfüllen, es besteht die Gefahr der Verunreinigung.
- Reinigen Sie die gesamte Flasche, einschließlich der Spitze, zwischen den einzelnen Anwendungen mit einem

Desinfektionstuch.

- Die Spülze/Dose der Flasche darf nicht mit anderen Materialien in Berührung kommen - falls dies doch geschieht, reinigen Sie sie sofort mit einem Desinfektionstuch.
- Wenn innerhalb von 24 Stunden nach der Verwendung von nicht sterilem Gel an oder in der Nähe der Stelle ein invasiver Eingriff vorgenommen wird, muss sichergestellt werden, dass alle Rückstände des Gels entfernt werden und die Haut gründlich mit einem antiseptischen Hautpräparat gereinigt wird, das den lokalen Richtlinien für den betreffenden Eingriff entspricht.
- Nur zur äußerlichen Anwendung.
- Darf nicht eingenommen werden.
- Kontakt mit den Augen vermeiden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.
- Das **Vue Ultraschall Gel** enthält kein Naturkautschuklatex.

UNERWÜNSCHTE NEBENEFFEKTE

Im Zusammenhang mit der Anwendung von **Vue Ultraschall Gel** sind keine Nebenwirkungen bekannt. In seltenen Fällen können jedoch lokale Reizungen oder Überempfindlichkeiten auftreten. Zu den Symptomen von Reizungen und Überempfindlichkeiten gehören Rötung, Juckreiz oder Blasenbildung. In diesem Fall ist die Anwendung von **Vue Ultraschall Gel** zu beenden und die Patientenakte zu aktualisieren.

Jeder schwierigweile Zwischenfall oder jede Fehlfunktion, die im Zusammenhang mit dem **Vue Ultraschall Gel** auftritt, muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.

ANWENDUNG

Beschreiben Sie die Flasche vor dem Gebrauch mit dem Datum des ersten Öffnens an der dafür bestimmten Stelle. Entsorgen Sie die geöffnete Flasche, wenn sie entweder leer ist, eine Monat nach der Öffnung oder nach Ablauf des Verfallsdatums, je nachdem, was zuerst eintritt (siehe Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen). Verschließen Sie Flasche zwischen den Anwendungen.

Waschen und trocknen Sie sich vor und nach jeder Anwendung von **Vue Ultraschall Gel** immer die Hände und tragen Sie stets ein sauberes Paar Schutzhandschuhe, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.

1. Reinigen Sie die Haut des Patienten vor dem Auftrag von **Vue Ultraschall Gel**.
2. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers des Produkts zur Durchführung von medizinischen Ultraschallverfahren.
3. Tragen Sie die erforderliche Menge **Vue Ultraschall Gel** auf den Hautbereich/das Gerät auf.
4. Entfernen Sie nach dem Verfahren anhaftendes Ultraschall Gel von der Haut des Patienten mit persönlichen Hygienetüchern oder waschen Sie den Patienten mit trockenen Tüchern und Seife und Wasser.
5. Trocknen Sie die Haut des Patienten anschließend gründlich mit Papierhandtuchem ab.

LAGERUNG UND HANDHABUNG

Lagertemperatur zwischen 5 °C und 30 °C. Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Ungeöffnete Packungen haben eine Haltbarkeit von 3 Jahren. Nicht nach dem Ablauf des Haltbarkeitsdatums verwenden.

ENTSORGUNG

Der **Vue Ultraschall Gel**, muss gemäß den örtlichen Richtlinien und Abfallentsorgungsverfahren entsorgt oder recycelt werden.

HERSTELLERINFORMATIONEN

Optimum Medical Solutions Ltd, Tenant Hall, Blenheim Grove, Leeds, LS2 9ET, Vereiniges Königreich. Telefon: +44 (0) 845 643 5479, E-Mail: enquiries@optimummedical.co.uk, Website: www.optimummedical.co.uk

BEVOLKMÄCHTIGTE VERTRETUNG

MT Promedt Consulting GmbH, Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Deutschland. Telefon: +49 (0) 689 458 1020, E-Mail: info@mt-procons.com

INFORMATIONEN FÜR EU-IMPORTEURE:

Optimum Medical Solutions GmbH, c/o Grant Thornton AG, Senckenbergsanlage 19, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland. E-Mail: anfragen@optimummedical.de

Este es un folleto de información para el usuario sobre el producto.

Lea el folleto informativo antes de usar el producto y guárdelo para futuras consultas.

Si tiene dudas sobre cómo aplicar este producto, o si es adecuado para usted, pida asesoramiento sanitario.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Vue Ultrasound Gel es un gel no estéril con base acuosa.

INGREDIENTES/COMPOSICIÓN

- Deionised water
- Carbomer
- Propylene glycol
- Triethanolamine
- Benzyl alcohol
- Methylchloroisothiazolinone
- Methylisothiazolinone

FINALIDAD

Vue Ultrasound Gel es un producto médico cuya finalidad es transmitir las ondas ultrasónicas durante exámenes de bajo riesgo a zonas con piel intacta; en exámenes que no implican procedimientos invasivos; o más de 24 horas antes de un posible procedimiento invasivo en el mismo sitio o cerca de él.

INDICACIONES DE USO / POSIBLE USUARIO

Vue Ultrasound Gel es un producto médico que los profesionales sanitarios han de usar durante las ecografías.

CONTRAINDICACIONES

- No utilizar para procedimientos invasivos, es decir, procedimientos guiados por ultrasonidos que impliquen el paso de un dispositivo a través de la piel hasta el tejido estéril, como la inserción de una vía intravenosa o la aspiración con aguja fina;
- No usar si un procedimiento invasivo está previsto en las próximas 24 horas: esto incluye la visualización o evaluación inicial» de una zona mediante ecografía antes de llevar a cabo un procedimiento invasivo (aseptico);
- No utilizar en partes en los que haya una alta probabilidad de cesárea o se vayan a usar instrumentos invasivos;
- No utilizar en caso de contacto o proximidad con piel dañada (cualquier alteración de la integridad de la piel, como un sarpullido o una herida quirúrgica, incluido el ombligo en los neonatos);
- No utilizar cuando la ecografía se haga cerca de un dispositivo invasivo permanente, como una vía intraviosa o un catéter suprapúbico;
- No utilizar cuando haya contacto con una membrana mucosa (por ejemplo, para procedimientos transrectales, transvaginales u oftálmicos);
- No utilizar para exámenes en personas gravemente inmunodeprimidas, en entornos de cuidados intensivos, de alta dependencia, o unidades equivalentes, incluyendo las unidades de cuidados intensivos neonatales;
- No utilizar en pacientes que sean alérgicos a algunos de los ingredientes o sean sensibles a ellos;
- No apto para emplearse con un desfibrilador, un electrocardiograma o un tratamiento con láser.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Se recomienda que **Vue Ultrasound Gel** se utilice de acuerdo a las políticas y los procedimientos sanitarios locales.
- Asegúrese de que el **Vue Ultrasound Gel** se adecúa a su finalidad y es compatible con otros productos sanitarios que vayan a utilizarse juntos con él.
- No utilizar si el bote está caducado, dañado, sucio o si el precinto viene roto antes del primer uso.
- No rellenar. Reutilizar o llenar el bote podría provocar una infección o la contaminación cruzada.

- No echar en botes más pequeños, ya que existe riesgo de contaminación.
- Limpiar todo el bote, incluyendo la punta, con una toallita desinfectante después de cada uso
- La punta del bote no debe entrar en contacto con nada: si lo hiciera, limpiar inmediatamente con una toallita desinfectante.
- si se lleva a cabo un procedimiento invasivo 24 horas después de usar un gel no estéril en la zona o cerca de ella, hay que asegurarse de que se limpian los restos de gel y se limpia a fondo la piel con un preparado antiséptico de acuerdo con la política local del procedimiento.
- Solo para uso externo.
- No ingerir.
- Evitar el contacto con los ojos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- **Vue Ultrasound Gel** no está fabricado con látex de caucho natural.

EFEKTOS SECUNDARIOS NO DESEADOS

No se conocen efectos secundarios asociados a **Vue Ultrasound Gel**. Sin embargo, en raras ocasiones, pueden producirse irritaciones o hipersensibilidad. Los síntomas de irritación o hipersensibilidad incluyen erupción, picor o ampollas. En caso de que esto ocurriera, deje de usar **Vue Ultrasound Gel** y asegúrese de actualizar la ficha médica del paciente.

Cualquier incidente grave o mal funcionamiento que se haya producido en relación con **Vue Ultrasound Gel** debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que este establecido el usuario y/o el paciente.

MODO DE EMPLEO

Antes de usarlo, ponga en el bote una etiqueta con la fecha de la primera apertura en el espacio previsto para tal fin. Una vez abierto, tire el bote cuando esté vacío, después de un mes o cuando se cumpla la fecha de caducidad; lo que venga primero (consulte las advertencias y precauciones). Cierre el tapón después de cada uso.

Lávese siempre las manos después y antes de usar **Vue Ultrasound Gel** y póngase unos guantes limpios cada vez para evitar la contaminación cruzada.

1. Limpie la piel del paciente antes de aplicar **Vue Ultrasound Gel**.
2. Siga las instrucciones facilitadas por el fabricante del producto para llevar a cabo la ecografía médica.
3. Aplique la cantidad necesaria de **Vue Ultrasound Gel** en la piel/equipo.
4. Tras el procedimiento, límpie los restos de gel de la piel del paciente con toallitas de higiene personal o límpie al paciente con toallitas secas y agua y jabón.
5. Seque después bien la piel del paciente con toallas de papel.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Guardar a una temperatura de entre 5°C y 30 °C. Mantener en un lugar seco y no exponer a luz solar directa. Los paquetes sin abrir tienen una fecha de caducidad de 3 años. No utilizar después de la fecha de caducidad.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

El **Vue Ultrasound Gel** debe reciclarse de acuerdo con las políticas locales y los procedimientos de eliminación de residuos, incluyendo los accesorios o consumibles utilizados con el dispositivo.

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

Optimum Medical Solutions Ltd, Tennant Hall, Blenheim Grove, Leeds, LS2 9ET, Reino Unido. Tel: +44 (0) 845 643 5479. Correo electrónico: enquiries@optimummedical.co.uk. Sitio web: www.optimummedical.co.uk

REPRESENTANTE AUTORIZADO

MT Promedt Consulting GmbH, Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Alemania. Tel: +49 6894 581020

Correo electrónico: info@mt-procons.com

INFORMACIÓN SOBRE EL IMPORTADOR

Optimum Medical Solutions GmbH, c/o Grant Thornton AG, Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt am Main, Alemania. Correo electrónico: enquiries@optimummedical.de

Il presente è un foglio informativo del prodotto per l'utente.

Leggere il foglietto informativo del prodotto prima dell'uso e conservarlo per riferimento.

In caso di dubbi sull'uso di questo prodotto o sulla sua idoneità, rivolgersi al medico.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Vue Ultrasound Gel è un gel non sterile, a base di acqua.

INGREDIENTI/COMPOSIZIONE

- Acqua deionizzata
- Carbomer
- Glicole propilenico
- Trietanolammmina
- Alcool benzilico
- Metildloroisotiazolinone
- Metilisotiazolinone

SCOPO PREVISTO

Vue Ultrasound Gel è un dispositivo medico pensato per la trasmissione di onde ultrasoniche durante esami a basso rischio in aree che coinvolgono la pelle intatta; esami che non comportano procedure invasive; o per l'utilizzo più di 24 ore prima di una probabile procedura invasiva nello stesso sito o in prossimità di esso.

INDICAZIONI PER L'USO / UTENTE PREVISTO

Vue Ultrasound Gel è un dispositivo medico destinato all'uso da parte degli operatori sanitari durante l'esecuzione di ecografie a ultrasuoni.

CONTROINDICAZIONI

- Non utilizzare per le procedure invasive, cioè qualsiasi procedura guidata dagli ultrasuoni che implica il passaggio di un dispositivo attraverso la pelle in un tessuto sterile, come l'inserimento di linee endovenose o l'aspirazione con ago sottile;
- Non utilizzare se è verosimile che venga intrapresa una procedura invasiva nelle 24 ore successive - questo include la 'visualizzazione' o la valutazione iniziale di un sito mediante ultrasuoni prima di intraprendere una procedura invasiva (asettica);
- Non utilizzare durante la fase del travaglio in cui vi è un'alta probabilità di parto cesareo o di strumentazi ne invasiva durante il parto;
- Non utilizzare in caso di contatto o vicinanza con pelle non intatta (qualsiasi alterazione dell'integrità della pelle, come un'eruzione cutanea o una ferita chirurgica, compreso l'ombelico nei neonati);
- Non utilizzare quando l'esame a ultrasuoni è vicino a un dispositivo invasivo fisso, come una linea endovenosa o un catetere sovrapposto;
- Non utilizzare in caso di contatto con una membrana mucosa (ad esempio per le procedure transrettali, transvaginali od oftalmiche);
- Non utilizzare per esami su individui gravemente immunocompromessi, in un ambiente di terapia intensiva, ad alta dipendenza o in unità equivalenti, comprese le unità di terapia intensiva neonatale;
- Non utilizzare se il paziente è sensibile o allergico a uno qualsiasi degli ingredienti;
- Non adatto all'uso con defibrillatore, ECG o trattamento laser.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Si raccomanda di utilizzare Vue Ultrasound Gel in linea con le politiche e le procedure sanitarie locali.
- Assicurarsi che Vue Ultrasound Gel sia adatto all'uso previsto e compatibile con altri dispositivi medici da utilizzare insieme ad esso.
- Non utilizzare se il flacone è scaduto, danneggiato, sporco o se il sigillo è rotto prima del primo utilizzo.
- Non ricaricare il flacone una volta terminato il prodotto. Il riutilizzo o il riempimento del flacone può provocare infezioni e/o contaminazioni incrociate.

- Non travasare in bottiglie più piccole, per evitare il rischio di contaminazione.
- Tra un utilizzo e l'altro, pulire l'intero flacone, compresa la punta, con una salvietta disinfettante.
- La punta/il beccuccio del flacone non deve entrare in contatto con nulla - se ciò dovesse accadere, pulire immediatamente la punta/beccuccio con una salvietta disinfettante.
- se successivamente viene intrapresa una procedura invasiva entro 24 ore dall'uso di gel non sterile nel sito o in prossimità di esso, assicurarsi che tutti i residui di gel vengano rimossi e che la pelle venga pulita accuratamente utilizzando una preparazione antisettica in linea con la politica locale per la procedura.
- Solo per uso esterno.
- Non ingerire.
- Evitare il contatto con gli occhi.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini
- Vue Ultrasound Gel non è realizzato con lattice di gomma naturale.

EFFETTI INDESIDERATI

Non sono noti effetti collaterali associati all'uso di Vue Ultrasound Gel, tuttavia in rari casi possono verificarsi irritazione o ipersensibilità locale. I sintomi di irritazione o di ipersensibilità includono rossore, prurito o veschie. Se ciò si verifica, interrompere l'uso di Vue Ultrasound Gel e assicurarsi che le cartelle cliniche del paziente siano aggiornate.

Qualsiasi incidente grave o malfunzionamento verificatosi in relazione a Vue Ultrasound Gel deve essere segnalato al produttore e all'Autorità competente dello Stato membro in cui si trova l'utente e/o il paziente.

MODALITÀ D'USO

Prima dell'uso, apporre sul flacone un'etichetta con la data di apertura nell'apposito spazio. Una volta aperto, smaltire il flacone quando vuoto, dopo un mese o alla data di scadenza, a seconda del caso (vedere avvertenze e precauzioni). Chiudere il tappo tra un utilizzo e l'altro.

Lavare e asciugare sempre le mani prima e dopo l'uso di Vue Ultrasound Gel e applicare un paio di guanti puliti in ogni occasione per evitare infezioni incrociate.

1. Pulire la pelle del paziente prima di applicare Vue Ultrasound Gel.
2. Seguire le istruzioni fornite dal produttore della strumentazione utilizzata per eseguire la procedura media di ecografia a ultrasuoni.
3. Applicare la quantità necessaria di Vue Ultrasound Gel sull'area della pelle/attrezzatura.
4. Dopo la procedura, rimuovere ogni residuo di gel per ultrasuoni dalla pelle del paziente utilizzando salviette per l'igiene personale o lavare con salviette asciutte del paziente e acqua e sapone.
5. In seguito, asciugare accuratamente la pelle del paziente con asciugamani di carta.

CONSERVAZIONE E TRATTAMENTO

Conservare a una temperatura tra 5°C e 30°C. Conservare in un luogo asciutto e lontano dalla luce solare diretta. Le confezioni non aperte hanno una durata di conservazione di 3 anni. Non usare dopo la data di scadenza

SMALTIMENTO

Vue Ultrasound Gel deve essere smaltito in base alle politiche locali e alle procedure di smaltimento dei rifiuti, compresi eventuali accessori / materiali di consumo utilizzati con il dispositivo.

INFORMAZIONI SUL PRODUTTORE

Optimum Medical Solutions Ltd, Tennant Hall, Blenheim Grove, Leeds, LS2 9ET, UK. Tel: +44 (0) 845 643 5479
E-mail: enquiries@optimummedical.co.uk Site web: www.optimummedical.co.uk

RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO

MT Promedt Consulting GmbH, Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Germania. Tel: +49 6894 581020
E-mail: info@mt-procons.com

INFORMAZIONI SULL'IMPORTATORE

Optimum Medical Solutions GmbH, c/o Grant Thornton AG, Senckenbergsanlage 19, 60325 Francoforte sul Meno, Germania. E-mail: enquiries@optimummedical.de

Tämä on käyttäjälle tarkoitettu tuoteseloste.

Lukeaa tuoteseloste kokonaan ennen käyttöä ja säälyttääkää se myöhempää tarvitta varten.

Jos olette epävarma tämän tuotteen käytöstä tai sopiko se tarkoitukseenne, kysyää neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta.

TUOTEKUVAUS

Vue Ultrasound Gel on ei-steriliili, vesipohjainen geeli.

AINESOSAT/KOOSTUMUS

- Deionisoituta vesi
- Karbomeeri
- Propyleeniglykoli
- Trietanolamiini
- Bentyylialkoholi
- Metyylilikloori-isotiaatsolinoni
- Metyyli-tiaatsolinoni

KÄYTTÖTARKOITUS

Vue Ultrasound Gel on lääketieteellinen väline, joka on tarkoitettu käytettäväksi ultraäänialtojen välittämiseen vähäriskissä tutkimuksissa alueilla, joilla on ehjä iho, tutkimuksissa, joihin ei liity invasiivisia toimenpiteitä, tai yli 24 tunta ennen todennäköistä invasiivista toimenpidettä samassa paikassa tai sen lähellä.

KÄYTÖÄIHEET / TARKOITETTU KÄYTÄJÄ

Vue Ultrasound Gel on lääkinäillinen väline, joka on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käytettäväksi ultraäänitutkimuksissa.

VASTA-AIHEET

- Ei saa käyttää invasiivisia toimenpiteisiin, eli miinhänkä ultraääniohjattuuhin toimenpiteisiin, joissa laite viedään ihon läpi steriili kudokseen, kuten suonensisäistä tai hielon neulan aspiraatioon;
- Ei saa käyttää, jos invasiivisen toimenpiteiden todennäköisesti suoritetaan seuraavan 24 tunnin aikana – tämä sisältää painik "tarkastuksen tai alustavan arvioinnin" ultraänällä ennen (aseptista) invasiivista toimenpidettä;
- Ei saa käyttää synnytyksessä, jos kesiarineikkaus tai invasiivisten instrumenttien todennäköisyys synnytyksen aikana on suuri;
- Ei saa käyttää kosketukessa vaurioituneeseen ihoon tai lähellä sitä (muutoksia ihon eheydessä, kuten ihottuma tai leikkauksissa, mukaan lukien napa vastasyntymällä);
- Ei saa käyttää, jos ultraänitutkimus tehdään lähellä pysisyvää invasiivista laitetta, kuten suonensisäistä letkuun tai suprapubista katetria;
- Ei saa käyttää paloissa, joissa se joutuu kosketukseen limakalvon kanssa (esimerkiksi transrektalisissa, transvaginalisissa tai ofalmissisissa toimenpiteissä);
- Ei saa käyttää tutkimuksissa valavasti immuunipuitteisilla henkilöillä, teholoidossa, korkean riippuvuuden tai vastavaassa yksikössä, mukaan lukien vastasyntyneiden teholuhotyöskiksi;
- Ei saa käyttää, jos potilaas on herkki tai allerginen jollekin välineen materiaaliille;
- Ei soveltu käytettäväksi defibrillaattoriin, sydänsähkökyräyn tai laserhoidon yhteydessä.

VAROITUKSET JA VAROTOIMENPITEET

- On suositeltavaa, että **Vue Ultrasound Gel** -geeli käytetään paikallisten terveydenhuoltotäytöjen ja -menetelyjen mukaisesti.
- Varmistakaa, että **Vue Ultrasound Gel** sopii aiottuun käyttöön ja on yhteensopiva muiden sen kanssa käytettävien lääkinäillisten välineiden kanssa.
- Ei saa käyttää, jos pullo on vanhentunut, vahingoittunut, likainen tai sinetti on rikki ennen ensimmäistä käyttöä.
- Ei saa taittua uudelleen. Pulloon uudelleenkäytöä tai -täytäminen voi johtaa infektiota ja/tai risikontaminaatioon.

- Ei saa dekantoida pienempiin pulloihin, koska siinä on olemassa kontaminaatiovara.
- Koko pullo, kärki mukaan lukien, on puhdistettava desinfointipyhykeella käyttötökerjen välliä.
- Pullon kärki/sutin ei saa joutua kosketuksiin minkään kanssa – siinä tapauksessa se täytyy puhdistaa väliittämästä desinfointipyhykeella.
- Jos invasiivinen toimenpide suoritetaan myöhempinä 24 tunnin kullessa ei-steriliin geelin käytöstä paikassa tai sen lähellä on varmistettava, että kaikki geelijäämät poistetaan ja he puhdistetaan perusteellisesti antiseptiseilla ihovalmisteella paikallisten käytäntöjen mukaisesti.
- Vain ulkoiseen käyttöön.
- Ei saa niellä.
- Kosketusta silmiin on vältettävä.
- Pidettävä lasten ulottumatomissa
- **Vue Ultrasound Gel** ei ole valmistettu luonnonkumilateksteistä.

EI-TOIVOTUT HAITTAVAIKUTUKSET

Vue Ultrasound Gel -geeli käyttöön ei liity tunnnettua sivuvaikutuksia, mutta harvoissa tapauksissa voi esiintyä paikallista ärsytystä tai yliperkkyyttä. Ärsytysen ja yliperkkydenoireita ovat punoitus, kutina tai rakkuloita. Jos näin tapahtuu, **Vue Ultrasound Gel** -geelin käytöö töäpettaa ja varmistaa, että potilaasiostot on päätytetty.

Kaikista **Vue Ultrasound Gel** -geeliin liittyvistä vakavista tapauksista tai toimintahäiriöistä tulee ilmoittaa valmistaajalle ja sen jäsenmäen toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttää ja/tai potilas sijaitsee.

KÄYTTÖOHJEET

Ennen käyttöä pulloon merkitään päivämäärä, jolloin se avattiin ensimmäisen kerran siihen tarkoitettuna kenttään. Avaimisen jälkeen tyhjiä pullo hävitettään, kuukauden kuluttua tai viimeisenä käytötpäivänä sen mukaan, mikä tulee ensin (katso varoitusteksti ja varotoimet). Sulje korkki käyttötökerjen välliä.

Pese ja kuivaa kädet aina ennen **Vue Ultrasound Gel** -geelin käytöötä ja sen jälkeen, ja käytä aina puhtaata käsineitä käsineitä onkaloissa.

1. Puhdistaa potilaan iho ennen **Vue Ultrasound Gel** -geelin levittämistä.
2. Noudata lääketieteellisen ultraänitoimenpiteen suorittamiseen käytettävän laitteet valmistajan antamia ohjeita.
3. Levitä tarvittaessa määrä **Vue Ultrasound Gel** -geelia ihon alle/välineelle.
4. Poista toimenpideen jälkeen jäljelle jäänyt ultraänangeeli potilaan henkilökohtaisilla hygiениapyykeillä tai pese pois potilaan kuivilla pyyhkeillä ja saippualla ja vedellä.
5. Kuivaa potilaan iho huolellisesti tämän jälkeen talouspaperilla.

SÄILYTTÄJÄ JA KÄSITTELY

Säilytyslämpötila 5–30 °C. Säilytettävä kuivassa paikassa poissa suorasta auringonvalosta.

Avaamattomien pakkausten säilytyysaika on 3 vuotta. Ei saa käyttää viimeisen käytötpäivän jälkeen.

HÄVITTÄMINEN

Vue Ultrasound Gel on hävitettävä paikallisten käytäntöjen ja jätehuolto menettelyjen mukaisesti, mukaan lukien kaikki välineen kanssa käytettyt kuluvat osat.

VALMISTAJA

Optimum Medical Solutions Ltd, Tennant Hall, Blenheim Grove, Leeds, LS2 9ET, UK. Puh.: +44 (0) 845 643 5479
Sähköposti: enquiries@optimummedical.co.uk. Verkkosivusto: www.optimummedical.co.uk

VALTUUTETTU EDUSTAJA

MT Promed Consulting GmbH, Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Sachsa. Puh.: +49 6894 581020
Sähköposti: info@mt-promcos.com

MAAHANTUOJA

Optimum Medical Solutions GmbH, c/o Grant Thornton AG, Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt am Main, Sachsa. Sähköposti: enquiries@optimummedical.de

Αυτό είναι ένα ενημερωτικό φυλλάδιο προϊόντος για τον χρήστη.

Διαβάσθε όλο το φυλλάδιο πληροφοριών προϊόντος πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για ενημέρωσή σας.
Εάν δεν είστε βέβαιο για το πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν ή είναι κατάλληλο, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Τζέλ υπερήχων Vue είναι ένα μη αποτελεσμένο τζέλ με βάση το νερό.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ/ΣΥΝΘΕΣΗ

- Απονεριανό νερό
- Carbomer
- Προπιλευγαλούκολη
- Τριανταφολικίνη
- Βενζύλικη ολοκολή
- Μεθυλογλυκοσιδειαζόλινον
- Μεθιολοθεσιοζόλινόν

ΠΡΩΒΑΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Το Τζέλ υπερήχων Vue είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για τη μετάδοση υπερηχητικών κυάνων κατά τη διάφορα εξετάσεων χαρτού πινόνων σε περιοχές με άμβωτο δέρμα - σε εξετάσεις που δεν περιλαμβάνουν επειγόντων διαδικασίες, ή πάνω από 24 ώρες πριν από μια πιθανή επειγόντικη διαδικασία στο ίδιο σημείο ή κοντά.

ΕΝΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ/ΠΡΩΒΑΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ

Το Τζέλ υπερήχων Vue είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από επαγγελματίες υγείας κατά την εκτέλεση εξετάσεων υπερήχων.

ΑΝΤΕΝΔΑΣΕΙΣ

- Να μην χρησιμοποιείται για επειγόντιες διαδικασίες, δηλαδή οποιαδήποτε διαδικασία καθοδήγησημένη από υπερήχων που περιλαμβάνει τη διεύθυνση μιας συσκευής μέσω του δέρματος σε στέριο ιστό, όπως η ενδοφέρεια επαγγελματική γραμμή ή η αναρρόφηση με λεπτή βέλωνα.
- Να μην χρησιμοποιείται είναι ιπιθανό να διεξαγθεί μια επειγόντικη διαδικασία τις επόμενες 24 ώρες – αυτό περιλαμβάνει παρακολούθηση ή αρχική οδογόληψη* ενώ σημειώνεται με υπερηχηγόρησμα πριν από τη διεναγμή (άσητης) επειγόντιας διαδικασίας.
- Να μην χρησιμοποιείται κατά τον τοκετό όπου υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κακορικής τομής ή χρήσης επειγόντιων οργάνων κατά τη διάρκεια του τοκετού.
- Να μην χρησιμοποιείται είχε όπως υπέρχει εποήη με ή κοντά σε μια δέρματος δέρμα (που ποδηλάτησε ολόνυμη στην ακεραιότητα του δέρματος).
- Μην τη χρησιμοποιείται στην περιοχή πλήρους ξερότητας σε αντικαταστήματα συσκευής, όπως μια ενδοφέρεια γραμμή ή έναν υπερηχωνικό καθετήρα.
- Να μην χρησιμοποιείται στον υπάρχει εποήη με βλεννογόνια (για παρόδειγμα για διορθωτικές διαδικασίες ή θεραπευτικές επεμβάσεις).
- Να μην χρησιμοποιείται για εξετάσεις σε ασφόρι ανοσοκατεταύματα στομάτου, σε περιβάλλον εντατικής θεραπείας, αυγής ή εξάρτησης ή πονοδόνησης μασάζ, συμπεριλαμβανομένων μονάδων εντατικής θεραπείας νεογόνων;
- Μην τη χρησιμοποιείται εάν ο ασθενής είναι ευαίσθητος ή άλεργος σε κάποιο από τα συστατικά;
- Δεν είναι κατάλληλο για χρήση με απωτόπτη, HGT ή θεραπεία με λεύκαινη.

ΠΡΟΙΟΝΤΟΠΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΥΣΕΙΣ

- Συνιστάται το Τζέλ υπερήχων Vue για τη χρησιμοποίηση αύρισκων με τις τοπικές πολιτικές και διαδικασίες μεγανομικής περιθώριψης.
- Βεβαιωθείτε ότι το Τζέλ υπερήχων Vue είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και συμβατό με όλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που θα χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με αυτό.
- Η μη χρησιμοποίηση είναι η φωτιά ξελύζει, έχει καταστροφή, λερωθεί ή η σφράγιση έχει σπάσει πριν από την πρώτη χρήση.
- Μην ξαναγεμίζετε. Η επαναχρησιμοποίηση ή το ξαναγέμισμα της φιλοτίκης μπορεί να οδηγήσει σε μόλυνση ή/και δισταγμό με μόλυνση.
- Μην μεταγείτε σε μικρότερες φιλοτίκες γιατί υπάρχει κινδύνος μόλυνσης.

- Καθαρίστε ολόκληρη τη φιλοτίκη, συμπεριλαμβανομένου του άκρου, με ένα απολυμαντικό μαντρίκι μεταξύ των χρήσεων.
- Το άκρο/ακροφύσιο της φιλοτίκης δεν πρέπει να έρχεται σε εποήη με πόπα – έδη έφεζη, καθηρίστε αμέσως με ένα απολυμαντικό μαντρίκι.
- εάν στη συνέχεια πραγματοποιηθεί μια επειγόντικη διαδικασία επότις 24 ωρών από τη χρήση μη αποτελεσμένου τζέλ στο σημείο ή κοντά στο σημείο, τότε βεβαιωθείτε ότι έχουν αιφαντεί όλα τα υπόλειμμα τζέλ και το δέρμα έχει καθαριστεί συγκλονικά χρησιμοποιώντας αντισηπτικό δερματικό παρασκευασμό συμφωνά με την τοπική πολιτική για τη διαδικασία.
- Μόνο για εξεργετική χρήση.
- Να μην καταποθετείται.
- Αποφύγετε την εποήη με τα μάτια.
- Κρατήστε το χωκάι από πάσσα.
- Το Τζέλ υπερήχων Vue δεν είναι κατακευασμένο με λατέξ από φυσικό κουσούτων.

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεν υπάρχουν γνωστές παρενεργείες που να σχετίζονται με τη χρήση του Τζέλ υπερήχων Vue, ωστόσο, σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί τοπικός ερεθισμός ή υπερευαισθησία. Τα συμπτώματα ερεθισμού ή υπερευαισθησίας περιλαμβάνουν ερυθρότητα, κινηρά ή φουσκάλη. Εάν αυμέβει αυτό, σπαστήστε τη χρησιμοποίηση του Τζέλ υπερήχων Vue και βεβαιωθείτε ότι οργιά αιθεριών ενημερώνονται.

Οποιοδήποτε οφέλος περιστατικό ή διαλειτουργία που έχει προκύψει σε σχέση με το Τζέλ υπερήχων Vue περιέπειται στον κατακευστή και στην Αρμόδια Αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή ο αιθερής.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν από τη χρήση, Επονέψατε τη φιλοτίκη με την πιερομηνύα που την ανοίγεται για πρώτη φορά στον παρεχόμενο χώρο. Αφού την ανοίξετε, επονέψτε τη φιλοτίκη επίσης στο δέρμα, είτε είναι μήπα μετά ή στην πιερομηνύα λήκης, ή συμβεβρωμένη (βλ. προειδοποιησείς και προφύλαξη). Κλείνετε το πώμα μεταξύ των χρήσεων.

Πάντα να πλένετε και να στεγνώσετε τη χέρια σας πριν και μετά τη χρήση του Τζέλ υπερήχων Vue και φορέστε ένα καθαρό ζευγάρι γάντια που θέτεται πάρα πολλά για να αποφύγετε τη διαταραχήμενη μίλωναν.

1. Καθαρίστε το δέρμα του ασθενούς πριν την εφαρμογή του Τζέλ υπερήχων Vue.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατακευστή του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της διαδικασίας ιατρικής εξάστασης υπερήχων.
3. Εφαρμόστε την αποπούμενη ποσότητα Τζέλ υπερήχων Vue στην περιοχή του δέρματος/του εξοπλισμού.
4. Μετά τη διαδικασία φορέστε τογών υπολειπόμενο τζέλ υπερήχων από το δέρμα του ασθενούς χρησιμοποιώντας μαντρίκια προστατικής υγείας ή ξελύζετε με στεγνά μαντρίκια ασθενούς και σαπονό και νερό.
5. Στεγνώστε καλά το δέρμα του ασθενούς στη συνέχεια με χαρτί κουζίνας.

ΑΠΟΧΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΙΡΙΣΜΟΣ

Αποδημούσετε μεταξύ 5°C και 30°C. Να διατηρείται σε τεγένη και μακριά από το άμεσο ήλιακο φως. Οι κλειστές συσκευασίες έχουν διάρκεια ζευγάρι επιστροφής. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την πιερομηνύα λήκης.

ΔΙΑΘΕΣΗ

Το Τζέλ υπερήχων Vue πρέπει να απορρίπτεται σε σημάντια ποσότητα σε παραγόμενη διάθεση πολιτικές και διαδικασίες αναλύσιμων που χρησιμοποιούνται με το προϊόν.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Optimum Medical Solutions Ltd, Tenant Hall, Blenheim Grove, Leeds, LS2 9ET, ΗΒ. Τηλ: +44 (0) 845 643 5479 Email: enquiries@optimummedical.co.uk Ιστότοκος: www.optimummedical.co.uk

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

MT Promete Consulting GmbH, Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Γερμανία. Τηλ: +49 6894 581020. Email: info@mt-procons.com

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ

Optimum Medical Solutions GmbH, c/o Grant Thornton AG, Sendenbergenanlage 19, 60325 Frankfurt am Main, Γερμανία. Email: enquiries@optimummedical.de

Dette er en folder med produktinformationer til brugeren.

Læs hele folderen med produktinformationer for brug, og gem den til fremtidig reference.

Hvis du er usikker på, hvordan du skal bruge dette produkt, eller om det er egnet til dig, skal du såge råd hos dit sundhedspersonale.

PRODUKTBESKRIVELSE

Vue Ultrasound Gel er en ikke-steril, vandbaseret gel.

INDHOLDSMATERIALE/DELE

- Deioniseret vand
- Carbomer
- Propyleneglycol
- Triethanolamin
- Benzylalkohol
- Methylchlorothiazolinon
- Methylisothiazolinon

TILTÆNKET FORMÅL

Vue Ultrasound Gel er et medicinsk udstyr, der er beregnet til at blive brugt til overførsel af ultralydsbolger under lavrisiko-undersøgelser i områder med intakt hud; i lavrisiko-undersøgelser i områder med intakt hud; i undersøgelser, der ikke involverer invasiv procedurer; eller mere end 24 timer for en sandsynlig invasiv procedure på eller i nærheden af det samme sted.

INDIKATIONER FOR BRUG / TILTÆNKET BRUGER

Vue Ultrasound Gel er et medicinsk udstyr, der er beregnet til at blive brugt af sundhedspersonale, når de udfører ultralyd.

KONTRAINDIKATIONER

- Må ikke anvendes til invasiv procedurer, dvs. enhver ultralydsvejledt procedure, der indebærer, at en anordning føres gennem huden ind i steril væv, f.eks. indszættelse af intravenos linje eller fin nåleaspirering;
- Må ikke anvendes, hvis der sandsynligvis skal foretages en invasiv procedure inden for de følgende 24 timer - dette omfatter "visning eller indledende vurdering" af et sted ved hjælp af ultralyd, før der foretages (aseptisk) invasiv procedure;
- Må ikke anvendes under fødsler, hvor der er stor sandsynlighed for kejsersnit eller invasiv instrumentering under fødslen;
- Må ikke anvendes ved kontakt med eller i nærheden af ikke-intakt hud (enhver ændring i hudens integritet som f.eks. udslæt eller kirurgisk sår, herunder navle hos nyfodte);
- Må ikke anvendes, hvis ultralydsundersøgelsen er i nærheden af en invasiv anordning, der ikke kan fjernes, f.eks. en intravens linje eller et suprapubisk kateter;
- Må ikke anvendes, hvor der er kontakt med en slimhinde (f.eks. ved transrektale, transvaginale eller oftalmiske procedurer);
- Må ikke anvendes til undersøgelser på alvorligt immunsvækkede personer, på intensivafdelinger, højafhængige afdelinger eller tilsvarende afdelinger, herunder neonatale intensivafdelinger;
- Må ikke anvendes, hvis patienten er følsom eller allergisk over for nogen af ingredienserne;
- Ikke egnet til brug sammen med en defibrillator, EKG eller laserbehandling.

ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER

- Det anbefales, at **Vue Ultrasound Gel** anvendes i overensstemmelse med lokale sundheds politikker og procedurer.
- Kontroller, om **Vue Ultrasound Gel** er egnet til den tilstigede anvendelse og er kompatibel med andet medicinsk udstyr, der skal bruges sammen med den.
- Må ikke anvendes, hvis flasken er forældet, beskadiget, tilsimset eller hvis forseglingen er brudt for første brug.
- Må ikke genfyldes. Genbrug eller genopfyldning af flasken kan fore til infektion og/eller krydskontaminering.

- Må ikke dekantes i mindre flasker, da der er risiko for kontaminering.
- Rengør hele flasken, herunder spidsen, med en desinficerende klud mellem brug
- Flaskens spids/dyse må ikke komme i kontakt med noget som helst – hvis det sker, skal den straks rengøres med en desinficerende klud.
- Hvis der efterfølgende foretages en invasiv procedure inden for 24 timer efter brug af ikke-steril gel på eller i nærheden af stedet, skal det sikres, at alt restende gel fjernes, og at huden rengøres grundigt ved hjælp af antiseptisk hudpræparat i overensstemmelse med den lokale politik for procedurer.
- Kun til udvortes brug.
- Må ikke indtagtes.
- Undgå kontakt med øjne.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- **Vue Ultrasound Gel** er ikke fremstillet af naturligt gummitak.

ØNSKEDE BIVIRKNINGER

Der er ingen kendte bivirkninger forbundet med brugen af **Vue Ultrasound Gel**, men i sjældne tilfælde kan der forekomme lokal irritation eller overfølsomhed. Symptomer på irritation og overfølsomhed omfatter rødme, klø eller blæzer. Hvis dette sker, skal du stoppe med at bruge **Vue Ultrasound Gel** og sikre, at patientjournalerne er opdateret.

Enhver alvorlig hændelse eller fejlfunktion, der er opstået i forbindelse med **Vue Ultrasound Gel**, skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i det medlemsland, hvor brugeren og/eller patienten befinner sig.

ANVENDELSE

Før brug skal flasken mærkes med datoen for første åbning på den dertil indrettede plads. Når flasken er åbnet, skal den bortsækkes, når den enten er tørt, efter en måned eller på udlebsdatoen, alt efter hvad der kommer først (se advarsler og forsigtighedsregler). Løg låget mellem hver brug.

Vask og tor altid dine hænder for og efter brug af **Vue Ultrasound Gel**, og brug altid et par rene handsker for at undgå krydsmitte.

1. Rengør patientens hud, inden du anvender **Vue Ultrasound Gel**.
2. Følg instruktionerne fra producenten af det udstyr, der anvendes til at udføre den medicinske ultralydsprocedure.
3. Påfør den nødvendige mængde **Vue Ultrasound Gel** på huden/området/udstyr.
4. Efter proceduren fjernes eventuelle rester af ultralydsgelen fra patientens hud ved hjælp af personlige hygiejenepipes eller vaskes af ved hjælp af torre patienttwipes og vand og sæbe.
5. Tor patientens hud grundigtbagefter med papirhåndklæder.

OPBEVARING OG HÅNDTERING

Opbevar mellem 5°C og 30°C. Opbevares tørt og væk fra direkte sollys. Uåbnede pakninger har en holdbarhed på 3 år. Må ikke anvendes efter udlebsdatoen.

BORTSKAFFELSE

Vue Ultrasound Gel skal bortsækkes i overensstemmelse med de lokale politikker og procedurer for affaldsborts-kaffelse, inklusive eventuelle tilbører / forbrugsstoffer, der bruges sammen med udstyret.

INFORMATION OM PRODUCENTEN

Optimum Medical Solutions Ltd, Tenant Hall, Blenheim Grove, Leeds, LS2 9ET, Storbritannien. Tlf.: +44 (0) 845 643 5479. E-mail: enquiries@optimummedical.co.uk. Websted: www.optimummedical.co.uk

AUTORISERET REPRÆSENTANT

MT Promedt Consulting GmbH, Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Tyskland. Tlf.: +49 6894 581020
E-mail: info@mt-promcons.com

INFORMATION OM IMPORTØR

Optimum Medical Solutions GmbH, c/o Grant Thornton AG, Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt am Main, Tyskland. E-mail: enquiries@optimummedical.de

Detta är en bipacksedel för användaren.

Läs här bipacksedeln före användning och spara den för kännedom.

Om du är osäker på hur du ska använda den här produkten eller huruvida den är lämplig för dig, rådfråga din vårdpersonal.

PRODUKTBESKRIVNING:

Vue Ultrasound Gel är en icke-steril, vattenbaserad gel.

INGREDIENSER/SAMMANSÄTTNING

- Avioniserat vatten
- Polyakrylylsa
- Propylenglykol
- Trietanolamin
- Benzyalkohol
- Metylklorisothiazolinon
- Metylsothiazolinon

AVSETT ÄNDAMÅL

Vue Ultrasound Gel är en medicinteknisk produkt, avsedd att användas för överföring av ultraljudsvägor under lägrikundersökningar i områden med intakt hud, vid undersökningar som inte innefattar invasiva ingreppt eller mer än 24 timmar före ett troligt invasivt ingrepp på eller i näheten av samma plats.

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING / AVSEDD ANVÄNDARE

Vue Ultrasound Gel är en medicinteknisk produkt, avsedd att användas av Vårdpersonal vid ultraljudsundersökningar.

KONTRAINDIKATIONER

- Använd inte för invasiva ingrep, dvs. alla ultraljudsstyrda ingrep som innefattar en anordning som förs genom huden in i steril vävnad, såsom införande av intravenösa kateter eller fin nålsaspireering;
- Använd inte om ett invasivt ingrepp sannolikt kommer att utföras under de följande 24 timmarna – inklusive "granskning och inledande bedömning" av ett område med ultraljud innan ett (aseptiskt) invasivt ingrepp utförs;
- Använd inte vid förlösning där sannolikheten för kejsarsnitt eller invasiva instrument under förlösningen är stor;
- Använd inte i kontakt med eller i näheten av icke-intakt hud (förändringar i hudens integritet såsom utslag eller operationsårs, inklusive navelsträng hos nyfödda);
- Använd inte om ultraljudsundersökning sker i näheten av en invasiv anordning som stannar i kroppen, t.ex. en intravenös kateter eller en suprapubisk kateter;
- Använd inte vid kontakt med slemhinnor (t.ex. vid transkretala, transvaginaла eller oftaimiska ingrep);
- Använd inte för undersökningar på allvarlig immunforsvagade personer, på intensivvårdsavdelningar, högberoende avdelningar eller motsvarande enheter, inklusive neonatal intensivvårdsavdelningar;
- Använd inte om patienten är känslig eller allergisk mot någon av ingredienserna;
- Inte lämplig för användning med en defibrillator, EKG eller laserbehandling.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSSANVISNINGAR

- Det rekommenderas att Vue Ultrasound Gel används i enlighet med lokala riktlinjer och rutiner för hälso- och sjukvård.
- Se till att Vue Ultrasound Gel är lämplig för den avsedda användningen och att den är kompatibel med andra medicintekniska produkter som ska användas tillsammans med den.
- Använd inte flaskan om den är utgängen, skadad, smutsig eller om förseglingen har brutits före första användningen.
- Återfyll ej. Återanvändning eller återfyllning av flaskan kan leda till infektion och/eller korskontaminerings.
- Dekanterar inte till mindre flaskor eftersom det då finns risk för kontaminerings.
- Rengör hela flaskan, inklusive spetsen, med en antiseptisk vätsverett mellan användningarna.
- Flaskans spets/munstycke får inte komma i kontakt med någonting – om det ändå sker, rengör den omedelbart med en antiseptisk vätsverett.

- Om ett invasivt ingrepp därefter genomförs inom 24 timmar efter användning av icke-steril gel på eller i näheten av platsen, se till att alla gälrester avlägsnas och att huden rengörs noggrant med antiseptiskt hudprep rat i enlighet med den lokala polycyn för ingreppet.
- Endast för extern användning.
- Får inte förtäras.
- Undvik kontakt med ögonen.
- Förvara utan räckhåll för barn.
- **Vue Ultrasound Gel** är inte tillverkad av naturgummilatex.

OÖNSKADE BIVERKNINGAR

Det finns inga kända biverkninigar i samband med användning av **Vue Ultrasound Gel**, men i sällsynta fall kan lokal irritation eller överkänslighet komma att uppstå. Symtom på irritation och överkänslighet omfattar rödhet, klåda eller blåsbildning. Om detta inträffar ska du sluta använda **Vue Ultrasound Gel** och se till att patientjournalen uppdateras.

Alla allvarliga incidenter eller funktionsfel som inträffar i samband med **Vue Ultrasound Gel** bör rapporteras till tillverkaren och den Behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten finns.

ANVÄNDNING

Före användningen, skriv datumet då flaskan öppnades i det avsedda utrymmet. Efter att flaskan har öppnats ska den kasseras när den är tom, efter en månad, eller vid utgångsdatumet, beroende på vilket som inträffar först (se varningar och försiktigheftsåtgärder). Stäng korgen när produkten inte används.

Tvätta och torka alltid händerna före och efter användning av Vue ultraljudsgel och använd ett par rena handskar vid varje tillfälle för att undvika korssmitta.

1. Rengör patientens hud innan du applicerar **Vue Ultrasound Gel**.
2. Följ instruktionerna från tillverkaren av den utrustning som används för att utföra det medicinska ultraljudsförarandet.
3. Applicera en lämplig mängd **Vue Ultrasound Gel** på hudområdet/utrustningen.
4. Efter ingreppet ska du avlägsna eventuell kvarvarande ultraljudsgel från patientens hud med hjälp av personlig antiseptisk vätsverett, eller tvätta av den med hjälp av torra servetter för patienter med tvål och vatten.
5. Torka sedan patientens hud noggrant med pappershanddukar.

LAGRING OCH HANTERING

Förvaras mellan 5°C och 30°C. Förvara torrt och inte i direkt solljus. Öppnade förpackningar har 3 års hållbarhet. Använd inte efter utgångsdatum.

KASSERING

Vue Ultrasound Gel måste kasseras i enlighet med lokala riktlinjer och avfallshanteringsrutiner, inklusive eventuella tillbehör / förbrukningsvaror som användes med enheten.

INFORMATION OM TILLVERKAREN

Optimum Medical Solutions Ltd, Tenant Hall, Blenheim Grove, Leeds, LS2 9ET, Storbritannien. Tel: +44 (0) 845 643 5479. E-post: enquiries@optimummedical.co.uk. Webbplats: www.optimummedical.co.uk

BEHÖRIG REPRÄSENTANT

MT Promed Consulting GmbH, Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Tyskland. Tel: +49 6894 581020. E-post: info@mt-procons.com

INFORMATION OM IMPORTÖREN

Optimum Medical Solutions GmbH, c/o Grant Thornton AG, Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt am Main, Tyskland. E-post: enquiries@optimummedical.de

Dette er et produktinformasjonshefte til brukeren.

Les hele produktinformasjonsheftet før bruk, og ta vare på det til bruk i fremtiden.

Hvis du er usikker på hvordan du bruker dette produktet eller om det er egnet, ta kontakt med lege.

PRODUKTBESKRIVELSE

Vue Ultrasound Gel er en ikke-steril, vannbasert gel.

INGREDIENSER/SAMMENSETNING

- Avionisert vann
- Karbomer
- Propylenglykol
- Trietanolamin
- Benzylalkohol
- Metylklorisotiazolinon
- Metylsoitazolinon

TILTENKT FORMÅL

Vue Ultrasound Gel er et medisinsk utstyr beregnet på å brukes for overføring av ultralydølger under lavris-koudersøkelse i områder som involverer intakt hud, i undersøkelser som ikke involverer invasive prosedyrer, eller mer enn 24 timer for en invasiv prosedyre på eller nær samme sted.

FORMÅL/BRUKSRØMÅDE

Vue Ultrasound Gel er et medisinsk utstyr beregnet på å brukes av helsepersonell når de gjennomfører en ultralydundersøkelse.

KONTRAINDIKASJONER

- Må ikke brukes til invasiv prosedyre, det vil si en ultralydveiledd prosedyre som innebærer å føre en enhet gjennom huden og inn i sterilt vev, for eksempel intravens linjeinnføring eller finnålaspirat.
- Ikke bruk hvis en invasiv prosedyre sannsynligvis vil bli utført i løpet av de påfølgende 24 timene. Dette inkluderer visning eller innledende vurdering av et sted med ultraldy for en (aseptisk) invasiv prosedyre.
- Ikke bruk under fødsel da det er stor sannsynlighet for keiser-snitt eller invasiv instruering under fødsel.
- Må ikke brukes i kontakt med eller i nærtetethet av ikke-intakt hud (enhver endring i hudens integritet som utslett eller operasjonssår, inkludert navle hos nyfødte).
- Ikke bruk der ultralydundersøkelsen er i nærtetethet av en inngeliggende invasiv enhet, for eksempel en intravens linje eller suprapubisk kateeter.
- Må ikke brukes der det er kontakt med en slimhinne (for eksempel for transkrale, transvaginale eller oftaleske prosedyrer).
- Må ikke brukes til undersøkelser av personer med alvorlig immunkompromittering, i intensivomsorg, hoyaktivitetseller tilsvarende enheter, inkludert neonatale intensivavdelinger;
- Må ikke brukes hvis patienten er følsom eller allergisk mot noen av ingrediensene;
- Ikke egnet for bruk med defibrillator, EKG eller laserbehandling.

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

- Det anbefales at **Vue Ultrasound Gel** brukes i tråd med lokale retningslinjer og prosedyrer for helsevesenet.
- Sørg for at **Vue Ultrasound Gel** er egnet for den tiltenkte bruken og kompatibel med andre medisinske enheter som skal brukes sammen med den.
- Ikke bruk hvis flasken er gått ut på dato, er skadet, skitten eller forseglingen er brutt før første gangs bruk.
- Må ikke etterfylles. Gjenbruk eller etterfylling av flasken kan føre til infeksjon og/eller krysskontaminerings.
- Ikke hell over på mindre flasker da det er fare for kontaminerings.
- Rengjør hele flasken, inkludert spissen, med en desinfeksjonserviett mellom hver bruk.
- Spissen/dysen på flasken må ikke komme i kontakt med noe. Hvis den gjør det, rengjør umiddelbart med en desinfeksjonserviett.

- Hvis en invasiv prosedyre deretter utføres innen 24 timer etter bruk av ikke-steril gel på eller i nærtetheten av stedet, sørг for at all gjenværende gel er fjernet og at huden er grundig rengjort med antiseptisk hudpreparat, i tråd med lokale retningslinjer.
- Kun til utvortes bruk.
- Må ikke sveiges.
- Unngå kontakt med øynene.
- Oppbevares utligjengelig for barn.
- **Vue Ultrasound Gel** inneholder ikke naturgummilateks.

ØNSKEDE BIVIRKNINGER

Det er ingen kjente bivirknninger ved bruk av **Vue Ultrasound Gel**, men i sjeldne tilfeller kan lokal irritasjon eller overfølsomhet oppstå. Symptomer på irritasjon eller overfølsomhet inkluderer rødhet, kloe eller blemmer. Hvis dette skjer, slutt å bruke **Vue Ultrasound Gel** og sørг for at pasientjournalene er oppdatert.

Enhver alvorlig hendelse eller funksjonsfeil som har oppstått i forbindelse med bruk av **Vue Ultrasound Gel** bør rapporteres til produsenten og den kompetente myndigheten der brukeren og/eller pasienten befinner seg.

BRUK

Før bruk, merk flasken med datoan for første åpning. Når den er åpnet, kast flasken når den er tom, etter én måned eller på utløpsdato, avhengig av hva som kommer først (se adviser og forholdsregler). Sett på korken mellom hver bruk.

Vask og tork henderne før og etter bruk av **Vue Ultrasound Gel**, og bruk et par rene hanskter hver gang, for å unngå kryssinfeksjon.

1. Rengjør pasientens hud før påføring av **Vue Ultrasound Gel**.
2. Følg instruksjonene gitt av produsenten av utstyret som brukes til å utføre den medisinske ultralydprosedyren.
3. Påfør den nødvendige mengden **Vue Ultrasound Gel** på hudområdet/utstyret.
4. Etter prosedyren, fjern eventuell gjenværende ultralydgel fra pasientens hud med desinfiseringservietter eller vask med med torne kluter, såpe og vann.
5. Tørk pasientens hud godt med papirhåndklær.

OPPBEVARING OG HÅNDTERING

Oppbevares mellom 5 °C og 30 °C. Oppbevares tort og utenfor direkte sollys. Uåpnede pakker har en holdbarhet på 3 år. Skal ikke brukes etter utløpsdato.

AVHENDNING

Vue Ultrasound Gel må avhendes i henhold til lokale retningslinjer og prosedyrer for avfallshåndtering, inkludert alt tilbehør/forbruksmateriell som brukes med enheten.

PRODUSENTINFORMASJON

Optimum Medical Solutions Ltd, Tenant Hall, Blenheim Grove, Leeds, LS2 9ET, Storbritannia.
Tlf.: +44 (0) 84 56 43 54 79. E-post: enquiries@optimummedical.co.uk. Web: www.optimummedical.co.uk

AUTORISERT REPRESENTANT

MT Promed Consulting GmbH, Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Tyskland. Tlf.: +49 68 94 58 10 20
E-post: info@mt-promcons.com

IMPORTINFORMASJON

Optimum Medical Solutions GmbH, c/o Grant Thornton AG, Senckenbergsanlage 19, 60325 Frankfurt am Main, Tyskland. E-post: enquiries@optimummedical.de

Dit is een productinformatiefolder voor de gebruiker.

Lees voor gebruik de volledige productinformatiefolder en bewaar deze ter informatie.

Als u niet zeker weet hoe u dit product moet gebruiken of u niet zeker bent of het geschikt is, raadpleeg dan een arts.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

Vue Ultrasound Gel is een niet steriele gel op waterbasis.

INGREDIËNTEN/SAMENSTELLING

- Gedurendeerd water
- Carbomeer
- Propyleen glycol
- Triethanolamine
- Benzylalcohol
- Methylchloroisothiazolinon
- Methylisothiazolinon

BEHOED GEBRUIK

Vue Ultrasound Gel is een medisch hulpmiddel bedoeld voor gebruik bij de transmissie van ultrasone golven tijdens onderzoeken met een laag risico op plaatsen met intacte huid; bij onderzoeken die geen invasieve ingrepen inhouden; of meer dan 24 uur vóór een waarschijnlijke invasieve ingreep op of nabij dezelfde plaats.

INDICATIES VOOR GEBRUIK / BEHOED GEBRUIKER

Vue Ultrasound Gel is een medisch hulpmiddel dat bedoeld is om te worden gebruikt door beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg bij het verrichten van echografie.

CONTRA-INDICATIES

- Niet gebruiken voor invasieve procedures, dat wil zeggen elke procedure onder geleide van ultrageluid waarbij een apparaat door de huid in steriel weefsel wordt gebracht, zoals het inbrengen van een intraveneuze lijn of een aspiratie met een fijne naald;
- Niet gebruiken als er in de volgende 24 uur waarschijnlijk een invasieve ingreep zal worden verricht - dit omvat ook het met behulp van echografie "bekijken of de eerste beoordeling" van een plek voorafgaand aan het verrichten van een (aseptische) invasieve ingreep;
- Niet gebruiken bij bevallingen waarbij de kans op een keizersnede of invasieve instrumentatie tijdens de bevalling groot is;
- Niet gebruiken bij contact met of in de nabijheid van niet-intacte huid (elke verandering in de integriteit van de huid, zoals huifuitslag of een operatiewond, met inbegrip van de navel bij pasgeborenen);
- Niet gebruiken wanneer het ultrageluidsonderzoek plaatsvindt in de nabijheid van een invasief apparaat dat in het lichaam is gebracht, zoals een intraveneuze lijn of een suprapubische katheret;
- Niet gebruiken wanneer er contact is met een slijmvlies (bijvoorbeeld voor transrectale, transvaginale of oogheelkundige procedures);
- Niet gebruiken voor onderzoek bij ernstig immunocompromitteerde personen, in een intensive-care-setting, een high-dependency of gelykjardige eenheid/eenheden, inclusief neonatale intensivecare-eenheden;
- Niet gebruiken indien de patiënt gevoelig of allergisch is voor één van de bestanddelen;
- Niet geschikt voor gebruik met een defibrillator, ECG of laserbehandeling.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSAMMELREGELLEN

- Het wordt aanbevolen om **Vue Ultrasound Gel** te gebruiken in overeenstemming met het plaatselijke beleid en de procedures in de gezondheidszorg.
- Zorg ervoor dat de **Vue Ultrasound Gel** geschikt is voor het beoogde gebruik en compatibel is met andere medische hulpmiddelen die in combinatie hiermee worden gebruikt.
- Niet gebruiken als de fles verouderd, beschadigd of bevuild is, of als het zegeel eerder dan bij het eerste gebruik verbroken is.

- Niet navullen. Hergebruik of hervulling van de fles kan leiden tot infectie en/of kruisbesmetting.
- Niet decanteren in kleinere flessen, want dan bestaat er gevaar voor verontreiniging.
- Reinig de hele fles, inclusief het uiteinde, met een ontsmettend doekje na gebruik.
- Het uiteinde/de spuitmond van de fles mag noergens mee in contact komen - als dat toch gebeurt, onmiddellijk schoonmaken met een ontsmettend doekje.
- Indien binnen 24 uur na het gebruik van niet-steriele gel een invasieve procedure wordt uitgevoerd op of in de buurt van die plek, moet ervoor worden gezorgd dat alle resterende gel wordt verwijderd en de huid grondig wordt gereinigd met een antisепtisch huidprepaaat overeenkomstig het plaatselijke beleid voor de procedure.
- Alleen voor extern gebruik.
- Niet om in te nemen.
- Vermijd contact met de ogen.
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- **Vue Ultrasound Gel** is niet gemaakt met natuurlijke rubberlatex.

ONGEWENSTE BIJWERKINGEN

Er zijn geen bekende bijwerkingen verbonden aan het gebruik van **Vue Ultrasound Gel**, in zeldzame gevallen kan echter lokale irritatie of overgevoeligheid optreden. Symptomen van irritatie en overgevoeligheid zijn onder meer roodheid, jeuk of blaarvorming. Als dit gebeurt, stop dan met het gebruik van **Vue Ultrasound Gel** en zorg ervoor dat de patiëntendossiers worden bijgewerkt.

Elk ernstig incident of elke storing met betrekking tot de **Vue Ultrasound Gel** dient te worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

GEBRUIKSAANWIJZING

Etiketter de fles op de daarvoor bestemde plek vóór gebruik met de datum van eerste opening. Eenmaal geopend moet de fles worden weggegooid wanneer deze leeg is, na één maand of op de vervaldatum, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet (zie waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen). Sluit de dop na gebruik.

Was en droog uw handen altijd voor en na het gebruik van **Vue Ultrasound gel** en gebruik steeds een schoon paar handschoenen om kruisbesmetting te voorkomen.

1. Reinig de huid van de patiënt vooraf aan **Vue Ultrasound Gel** aanbrengt.
2. Volg de instructies van de fabrikant van de echografie-apparatuur bij het uitvoeren van de medische echografieprocedure.
3. Breng de benodigde hoeveelheid **Vue Ultrasound Gel** op de huid/apparatuur aan.
4. Verwijder na de procedure met persoonlijke hygiënische doekjes alle resterende ultrasone gel van de huid van de patiënt, of was die af met droge patiëntendoekjes en zeep en water.
5. Droog de huid van de patiënt daarna goed af met papieren handdoekjes.

OPSLAG EN HANTERING

Bewaren tussen 5°C en 30°C. Droog en buiten direct zonlicht bewaren. Ongeopende verpakkingen zijn 3 jaar houdbaar. Niet gebruiken na de vervaldatum.

VERWIJDEREN

De **Vue Ultrasound Gel** moet worden afgevoerd volgens het plaatselijke beleid en de afvalverwerkingsprocedures, met inbegrip van alle accessoires/verbruiksartikelen die met het apparaat werden gebruikt.

INFORMATIE OVER DE FABRIKANT:

Optimum Medical Solutions Ltd, Tennant Hall, Blenheim Grove, Leeds, LS2 9ET, VK. Tel.: +44 (0) 845 643 5479
E-mail: enquiries@optimummedical.co.uk. Website: www.optimummedical.co.uk

GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER

MT Promedt Consulting GmbH, Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Duitsland. Tel.: +49 6894 581020
E-mail: info@mt-promcons.com

IMPORTEURGEGEVENS

Optimum Medical Solutions GmbH, c/o Grant Thornton AG, Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland. E-mail: enquiries@optimummedical.de

该产品信息手册供用户使用。

使用前，请阅读本产品信息手册并留供以后参考。

如不确定如何使用本产品，或不确定是否适合使用本产品，请寻求医生建议。

产品描述

Vue 超声凝胶是一种未灭菌水基凝胶。

成分/组成

- 去离子水
- 卡波姆
- 内二醇
- 三乙醇胺
- 苯醇
- 甲基氯异噻唑酮
- 仲羟异噻唑酮

用途

Vue 超声凝胶是一种可在以下场景中用于传输超声波的医疗设备：未受损皮肤的低风险检查；不涉及侵入性手术的检查；或在同一部位或附近进行可能的侵入性手术前 24 小时。

使用说明/预期用户

Vue 超声凝胶是一种供医护人员进行超声检查时使用的医疗设备。

禁忌症

- 请勿用于侵入性手术，即任何需要将设备穿过皮肤进入无菌组织的超声引导下的手术，如静脉输液管插入或细针抽吸；
- 请勿在可能需要进行侵入性手术前的 24 小时内使用--包括在进行（灭菌）侵入性手术前用超声对某一部位进行“观察或初步评估”；
- 若分娩过程中很可能进行剖腹产或侵入性器械操作，请勿使用；
- 请勿用于接触或接近非接触性皮肤的地方（任何皮肤无损性改变，如皮疹或手术伤口，包括新生儿的脐部）；
- 请勿在超声检查后置留侵入性设备的地方使用，如静脉注射管或耻骨上导管；
- 请勿用于与粘膜接触的地方（例如经直肠、经阴道或眼科手术）；
- 请勿对严重免疫力低下，在重症监护室、高度依赖性或同等情况下（包括新生儿重症监护室）的人进行检查；
- 如果患者对任何成分敏感或过敏，请勿使用。

警告和注意事项

- 建议根据当地医疗保健政策和程序使用 **Vue 超声凝胶**。
- 确保 **Vue 超声凝胶**适用于预期用途，并将其与之结合使用的医疗设备兼容。
- 请勿使用废弃、损坏、弄脏的瓶子或首次使用前密封破损的瓶子。
- 请勿重新灌装。重复使用或重新填充瓶子可能导致感染和/或交叉污染。
- 请勿倾倒较小的瓶子中，有污染风险。
- 二次使用前，请用消毒剂擦拭整个瓶子，包括瓶口。
- 瓶子的尖端/喷嘴不应与任何东西接触——如果已接触，请立即用消毒湿巾清洁。
- 如在使用未灭菌凝胶后的 24 小时内，需要在使用部位或周围进行侵入性手术，则应确保清除所有残留的凝胶，并根据当地的手术政策，使用消毒皮肤制剂对皮肤进行彻底清洁。
- 仅限外用。

- 不可摄入。

- 避免接触眼睛。

- 请将本品放在儿童接触不到的地方。

- **Vue 超声凝胶**不是由天然橡胶乳胶制成。

不良反应

Vue 超声凝胶没有已知副作用，但极少数情况下，可能会出现局部刺激或过敏现象。刺激或过敏的症状包括发红、发痒或起泡。如果发生这种情况，请停止使用 **Vue 超声凝胶**，并确保更新病历。

任何与 **Vue 超声凝胶**相关的严重事故或故障都应报告给制造商和用户和/或患者所在成员国的主管当局。

使用方法

使用前，请在瓶口处标明首次开封的日期。一旦开封，请在空瓶、一个月后或到期日（以最早日期为准）处置瓶子（请参阅警告和注意事项）。使用后请关闭瓶盖。

在使用 **Vue 超声凝胶**前后一定要清洗并擦干双手，每次都要戴上一副干净的手套，以避免交叉感染。

1. 在使用 **Vue 超声凝胶**之前，请清洁患者的皮肤。

2. 遵循所使用的设备制造商提供的说明，进行医疗超声检查。

3. 在皮肤/设备区域涂抹所需剂量的 **Vue 超声凝胶**。

4. 手术结束后，使用卫生湿巾清除患者皮肤上残留的超声凝胶，或用干纸巾和肥皂水清洗。

5. 事后用纸巾彻底擦干患者的皮肤。

储存和处理

储存温度应在 5°C 和 30°C 之间。

保持干燥，避免阳光直射。

包装开封前有 3 年的保质期。

过期后请勿使用。

弃置 TR

Vue 超声凝胶必须根据当地政策和废物处理程序进行处理，包括与设备一起使用的任何附件/消耗品。

制造商信息

Optimum Medical Solutions Ltd, Tennant Hall, Blenheim Grove, Leeds, LS2 9ET, UK

电话 : +44 (0) 845 643 5479

邮箱 : enquiries@optimummedical.co.uk

网址 : www.optimummedical.co.uk

授权代表

MT Promed Consulting GmbH, Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Germany

电话 : +49 6894 581020

邮箱 : info@mt-promcons.com

进口商信息

Optimum Medical Solutions GmbH, c/o Grant Thornton AG, Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt am Main, Germany. 電子郵件 : enquiries@optimummedical.de